

造影検査を受けられた方へ

本日、あなたが受けられた造影検査では、下記の造影剤を使用いたしました。

使用日時 年 月 日 午前・午後 時 分

薬品名 () イオパミドール () イオヘキソール () イオメロン
 () オムニパーク

このお薬は、尿と一緒に排出されます（腎臓の機能が正常な方では、約2時間で注射されたお薬の半分が排出されます）。本来体に対する影響の少ないお薬ではありますが、なるべく早く体の外へ出すことが理想的で望ましいと言われております。本日は水分（お水、お茶など）を多めに摂るようにして下さい。食事は普段どおりで結構です。ただし、糖尿病、腎臓病、肝臓病、高血圧症などで水分制限を指導されている方や、食事療法を行っていらっしゃる方は主治医にご相談下さい。

本日ヨード造影剤を使用した方は、場合によってまれではありますが検査終了後1時間から数日の間に下記のような症状が現れることがあります。

じん麻疹、手足のむくみ、かゆみ、吐き気、咳、のどのイガイガ感、
声がかれる、頭痛、めまい、息苦しい、胸が苦しい など

これらの症状やその他何か異常が現れた場合は、ただちに診察を受けられた診療科にご連絡下さい。その際には、この用紙を必ずご準備下さい。

また、その他今回の検査で何か変わった症状が現れた方は、後日でも結構ですので必ず主治医にその旨をお伝え下さい。さらに、次に造影検査を受けられる際にも検査担当医師にお伝え下さい。

【連絡先】

鹿児島市立病院

〒890-8760

鹿児島市上荒田町 37-1

電話代表 099-230-7000

FAX 代表 099-230-7070

※業務時間外(17時15分以降) 救急センターの方へお問い合わせ下さい。